

Vincenzo Ferrara MD



Patologie dell'Apparato Genitale / 1

FIMOSI
(prepuzio stretto)

FIMOSI

(prepuzio stretto)

Cosa devo fare se ho un prepuzio stretto?

Si definisce fimosi quella condizione patologica per cui la pelle che ricopre la punta del pene (prepuzio), non può essere retratta fino in fondo, causando difficoltà all'igiene, dolore all'erezione, a volte difficoltà ad una corretta minzione.

Quando il prepuzio si infiamma (balanopostite), diventando rosso o doloroso, è necessario contattare il medico di famiglia. Se un prepuzio stretto è stato ritirato e non può essere portato di nuovo in avanti, (parafimosi), è bene recarsi urgentemente in ospedale per un trattamento chirurgico.

Cosa può causare la fimosi?

Nei bambini, un prepuzio stretto è di solito congenito, ma, negli adulti, è spesso causa di esiti infiammatori o da patologie come la balanite sclerotica obliterante, di cui non conosciamo la causa.

Trattamento

Creme cortisoniche sono utili in caso di infiammazione e di lievi lesioni superficiali.

In caso di infiammazioni acute è bene associare una terapia con antibiotici.

La circoncisione (associata o meno alla frenuloplastica di allungamento), è il cardine del trattamento se il prepuzio è segnato da balanite obliterante sclerotica.
